

愛滋病防治教育





被愛滋病打敗
超人



★ 全球愛滋病每年新增加的感染者中，每五名就有一名是青少年，15~24歲的青少年是愛滋病的高危險群。如何免於愛滋的威脅呢？



AIDS腦內大革命

1.在愛滋病病毒的感染初期，因為有空窗期，所以可能檢查不出來。

2.愛滋病的全名是「後天免疫缺乏症候群」，簡稱AIDS，會破壞人體的「中樞神經系統」。

愛滋病會破壞人體的「免疫系統」。


3.保險套的使用，可以降低傳染愛滋病毒的機會，但是必須全程、正確的使用。

4.性行為時，接觸到帶有病毒的血液、精液、陰道分泌物，都有可能感染愛滋病。






愛滋病是甚麼？



- 愛滋病是由愛滋病病毒引致的傳染病
- 愛滋病的學名是「後天免疫力缺乏症」
Acquired Immune Deficiency Syndrome
簡稱 AIDS
- 愛滋病病毒的學名是「人類免疫力缺乏病毒」
Human Immunodeficiency Virus
簡稱 HIV





病原體:人類免疫缺乏病毒

(HIV Human Immunodeficiency Virus, 簡稱愛滋病毒)



愛滋病是如何得到的？



傳染途徑



性行爲傳染
(70~80%)



血液傳染：
1.輸血3~5%
2.針頭5~10%



母子垂直傳染
(5~10%)



性行為傳染

愛滋病病毒感染者的精液或陰道分泌液中含有病毒，而這種病毒可經由陰道、陰莖、直腸或口部，進入人體。

其中，肛門性交是危險的行為。



母子垂直傳染

已感染 HIV 的母親，會在妊娠期、生產分娩時或因哺乳時，將病毒傳給嬰兒。感染率約15~50%。尤其是在分娩時期，胎兒碩大的身軀需要通過狹窄的產道時，母體的出血，會夾雜著羊水浸入嬰兒的口、鼻、眼等處，導致初生嬰兒感染。



血液傳染

- (一) 輸進HIV感染者的血液及血液製劑。
- (二) 與HIV感染者共用針頭、針筒、藥物稀釋液，如：靜脈注射毒癮者、及醫護人員被針刺傷等。
- (三) 刺傷皮膚、粘膜，如：與HIV感染者共用刮鬚刀、牙刷、紋身、穿耳洞。
- (四) 移植感染者的器官或組織等，含精子、皮膚、各種臟器之移植。



愛滋病的發病狀況



空窗期

- 愛滋病毒感染後,需要經過一段時間,血液才會產生愛滋病毒抗體,因此在感染的早期,可能因抗體尚未產生,而檢驗呈陰性反應,此即為空窗期
- 一般空窗期約是感染愛滋病毒後3個月



潛伏期

- 感染愛滋病毒後到出現臨床症狀的期間，一般是5-10年以上



感染愛滋病毒後，會有什麼症狀？

病毒感染

經數週或數月出現急性症狀：淋巴腺腫、脾腫、出汗、發燒、疲倦、皮膚發疹、肌肉關節疼痛、咽喉疼痛。

經數天或數週痊癒進入潛伏期半年至十年

全身性淋巴腺腫大

體重急遽減輕（10%以上）、疲倦、夜間盜汗、持續發燒（3個月以上）、下痢、淋巴腺腫大



出現卡波西氏肉瘤、肺囊蟲肺炎、庖疹、白色念珠菌症、梅毒等。

伺機性感染



什麼樣的情況不會感染愛滋病？

- 擁抱撫摸
- 共用盥洗用具：馬桶、水龍頭、毛巾
- 咳嗽、打噴嚏
- 共乘車子
- 共用電話，文具
- 共餐
- 蚊蟲叮咬
- 淺吻
- 游泳、洗溫泉



愛滋病如何預防？




安全性行爲


- 沒有**體液交換**
- 全程**正確使用保險套**
- 避免**深吻，口交，體外射精**，及任何沒有採取保護措施或造成出血的性行爲




使用保險套，就可以預防愛滋病？




保險套 的正確使用法



拿手絕套七式




看



撕



擠



扭



套



取




丟



保險套使用注意事項

- 有效期限？
- 放在陰涼處？
- 色澤？
- 全程使用？
- 破了時怎麼辦？
- 潤滑劑？






我來保護你們



培養正確態度 阻止性病蔓延





「永保安康」符，有「戴」有保佑

- 認識愛滋病，遠離愛滋不僥「性」！
 - 慎選性伴侶，不濫交、不亂愛！
 - 單一性伴侶，一個啱啱好！
 - 全程使用保險套，健康「套」的住！
- 出門在外有一「套」，防範措施要做好！
 - 進行愛滋病篩檢，確保健康沒煩惱！

遠離愛滋 · 戴頭做起



Safeway 數位保險套 獨家贊助

別讓一時疏忽 · 造成終身遺憾



衛生署疾病管制局

關心您



謝謝聆聽

